



Prise en charge en cas d'accident-exposition sang ou liquide biologique (AES) VHB et VHC

Type d'exposition	Parentérale	Peau ou muqueuse lésée	Sexuelle (vaginale, anale)
	VHC: risque présent même lorsque délai d'utilisation inconnu (aiguille dans poubelle...)		En cas d'agression sexuelle: ♀ à référer en gynécologie pour le constat; ♂ à adresser au SU adultes. Évaluer: rappel vaccination DITE, test de grossesse.



Hep B: Attitude en urgence

Hep. B: Attitude selon taux AC de la personne exposée

Pour toute question, cf contacts au dos.

⚠ *Employés des HUG: consulter le Service Santé du Personnel en semaine de 07h30 à 17h00; sinon consulter en l'Unité d'Urgences Ambulatoires (entrée des urgences adultes), puis contacter le SSP pour le suivi.*

HUG Hôpitaux Universitaires Genève

* Personne exposée: le taux d'anticorps anti-HBs est à obtenir dans les 24-48 heures. Le personnel soignant devrait être vacciné et la réponse vaccinale connue: pour les répondeurs (Ac anti-HBs > 100 U/l), aucun dosage des anti-HBs, ni rappel vaccinal ne sont nécessaires.

** Immunoglobulines anti-VHB : HBIG adultes : 800 UI (12 UI/kg) IM dans la fesse jusqu'à 72h maximum.